

35. En caso de muerte materna o mujeres que sobrevivieron a complicaciones describa si se identificaron algunas de las siguientes condiciones: (1=No, 2=Si)

Trastornos cardiovasculares

- a) Shock
- b) Paro cardiaco
- c) Hipoperfusion severa (lactato >5 mmol/l o >45 mg/dl)
- d) Acidosis severa (pH $<7,1$)
- e) Administracion continua de agentes vasoactivos
- f) Reanimacion cardiopulmonar

Insuficiencia respiratoria

- g) Cianosis aguda
- h) Respiracion jadeante
- i) Taquipnea severa (frecuencia respiratoria >40 rpm)
- j) Bradipnea severa (frecuencia respiratoria <6 rpm)
- k) Hipoxemia severa (saturacion de oxigeno $<90\%$ durante ≥ 60 minutos o $PAO_2/FiO_2 <200$)
- l) Intubacion y ventilacion que no tienen relacion con la anestesia

Insuficiencia renal

- m) Oliguria que no responde a hidratacion o diureticos
- n) Azotemia aguda severa (creatinina >300 $\mu\text{mol/ml}$ o $>3,5$ mg/dl)
- o) Dialisis en caso de insuficiencia renal aguda

Trastornos de la coagulación

- p) Alteraciones de la coagulacion
- q) Trombocitopenia aguda severa (<50.000 plaquetas/ml)
- r) Transfusion masiva de sangre / globulos rojos (≥ 5 unidades)

Insuficiencia hepática

- s) Ictericia en presencia de preeclampsia
- t) Hiperbilirrubinemia aguda severa (bilirrubina >100 $\mu\text{mol/l}$ o $> 6,0$ mg/dl)

Trastornos neurológicos

- u) Inconsciencia prolongada o coma (duracion >12 horas)
- v) Accidente cerebrovascular
- w) Crisis epilepticas incontroladas / estado epiléptico
- x) Paralisis generalizada

Disfunción uterina

- y) Histerectomia despues de infeccion o hemorragia uterina